

Positionering - centreret - indblænding



HD

Én ventro-dorsal optagelse

Positionering:

Columna skal være i tæt kontakt med underlaget

Pelvis skal være symmetrisk

Bagbenene skal være parallelle

Knæene skal være pronerede

Knæene skal være i kontakt med underlaget

Der **centreres** på kanten af ischium

Der **indblændes**, så optagelsen inkluderer pelvis og begge knæled

Ved korrekt **positionering** undgås distortion
Ved korrekt **centrering** undgås distortion
Snæver **indblænding** har betydning for strålehygiejne og radiografisk billedkvalitet

AD

Én medio-lateral optagelse af hvert led

Obs. Uden raster

Positionering: Den laterale og mediale del af kondylen skal være projiceret ovenpå hinanden og leddet flekteret 45 – 60°

Der **centreres** på den mediale epikondyl

Der **indblændes**, så **kun** albueleddet er med på optagelsen

OCD

Én medio-lateral optagelse af hvert led

Obs. Anvend raster ved objekttykkelse >10 cm

Positionering: Det aktuelle forben tækkes cranio-ventralt, samtidig med at hoved og hals skubbes let dorsalt, og det modstående forben trækkes caudo-dorsalt

Centrering: Tuberculum major lokaliseres ved palpation, og der centreres caudalt herfor

Der **indblændes**, så **kun** skulderleddet er med på optagelsen

Test af positionering (+ præsentation på monitor)

